



TITLE:

岩沢加群の類数公式
(\mathbb{Z}_p 拡大およびその関
連理論の研究)

AUTHOR(S):

中里, 肇; 福田, 隆

CITATION:

中里, 肇 ...[et al]. 岩沢加群の類数公式 (\mathbb{Z}_p 拡大およびその
関連理論の研究). 数理解析研究所講究録 1981, 440: 85-102

ISSUE DATE:

1981-10

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/102814>

RIGHT:

岩沢加群の類数公式

東工大・理 中里 肇

福田 隆

§0. Introduction

p を奇素数とする. k を \mathbb{Q} の有限次拡大とし, k_∞ を k の cyclotomic \mathbb{Z}_p 拡大 $k\mathbb{Q}_\infty$ とする. ここに \mathbb{Q}_∞ は \mathbb{Q} 上の唯一の \mathbb{Z}_p 拡大である. $n \geq 0$ に対し, k_n を k_∞/k の中間体で k 上の次数が p^n であるものとし, $\Gamma_n = \text{Gal}(k_\infty/k_n)$ とおく. A_n を k_n の ideal 類群の p -Sylow 部分群とし, D_n を A_n の部分群で p 上の primes の積を含む類から成るものとする. $A'_n = A_n/D_n$ とおく (c.f. [6]).

k を CM 体とする. k_∞ も CM 体である. j で k_∞ の複素共役を表す. 任意の $\mathbb{Z}[\{i, j\}]$ -加群 M に対し,

$$M^- = \{a \in M \mid (1+j)a = 0\}$$

とおく.

(0.1) 定義. $A_\infty^- = \varinjlim A_n^-$, $A'_\infty^- = \varinjlim A'_n^-$ とおく.

Greenberg [3] と \tilde{u} Ferrero-Greenberg [2] は k が絶対abel

体の時, $(A'_\infty)^{\Gamma_h}$ の位数は有限であることを証明した。我々は $[\mathbb{R}:\mathbb{Q}]$ が p と素である時, その位数を p 進 L 関数を用いて計算する。

以後 \mathbb{R}/\mathbb{Q} は有限次虚abel拡大で $[\mathbb{R}:\mathbb{Q}]$ は p と素であるとする。 $G = \text{Gal}(\mathbb{R}/\mathbb{Q})$, \hat{G} を指標群 $\text{Hom}(G, \overline{\mathbb{Q}}_p^\times)$ とする。ここで $\overline{\mathbb{Q}}_p$ は \mathbb{Q}_p の代数閉包である。類体論により, \hat{G} の元を \mathbb{R}/\mathbb{Q} の原始 Dirichlet 指標と見なす。 ω を mod p の Teichmüller 指標とする。 $\phi \neq \omega$, $\phi(j) = -1$ である $\phi \in \hat{G}$ をとり, $L_p(s; \omega\phi^{-1})$ を $\omega\phi^{-1}$ に付随する p 進 L 関数とする。 p 進 L 関数の岩沢の構成法により, $k \in 1+p\mathbb{Z}_p$, $k \notin 1+p^2\mathbb{Z}_p$ に対し,

$$f(k^{s-1}; \omega\phi^{-1}) = L_p(s; \omega\phi^{-1})$$

となる巾級数 $f(T; \omega\phi^{-1}) \in \Lambda_\phi$ が存在する。ここで, $\mathbb{Z}_p[\phi] = \mathbb{Z}_p[\{\text{all values of } \phi\}]$, $\Lambda_\phi = \mathbb{Z}_p[\phi][[T]]$ である。

$$f(0; \omega\phi^{-1}) = L_p(0; \omega\phi^{-1}) = (1 - \phi^{-1}(p)) L(0; \phi^{-1})$$

であることに注意する。

(0.2) 定義. $\hat{f}(T; \omega\phi^{-1}) \in \Lambda_\phi$ を

$$\hat{f}(T; \omega\phi^{-1}) = \begin{cases} f(T; \omega\phi^{-1})/T & \text{if } \phi(p)=1, \\ f(T; \omega\phi^{-1}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

で定義する。

Ferrero - Greenberg [2] は $\hat{f}(0; \omega\phi^{-1}) \neq 0$ であることを証

明した。従って, $\hat{f}(j-1; \omega\phi^{-1}) \neq 0$ for all j with $j^{p^n} = 1$, $n \geq 0$ であり, $\Lambda_\phi / (\hat{f}(T; \omega\phi^{-1}), \omega_n)$ の位数は有限である。ここで $\omega_n = (1+T)^{p^n} - 1$ である。

有限集合 A に対し, $\#A$ で A の濃度を表す。群 G の表現が \mathbb{Q}_p -既約であるとは, ϕ が \mathbb{Q}_p 上定義され, \mathbb{Q}_p 上既約であることとする。 G の指標が \mathbb{Q}_p -既約とは, ϕ が G の或る \mathbb{Q}_p -既約表現の指標であることとする。

(0.3) 定理. (1) \mathbb{Q}_p/\mathbb{Q} は有限次 abel 拡大であり,

(2) \mathbb{Q}_p は虚であり,

(3) $[\mathbb{Q}_p:\mathbb{Q}]$ は p と素であると仮定する。

この時,

$$\#(A_\infty^-)^{\Gamma_n} = \# \bigoplus_{\pm} \Lambda_\phi / (\hat{f}(T; \omega\phi^{-1}), \omega_n) \quad \text{for all } n \geq 0$$

が成立する。ここで, \pm は $G = \text{Gal}(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Q})$ の \mathbb{Q}_p -既約指標で $\pm \neq \omega$, $\pm(j) \neq \pm(1)$ であるもの全体を動く, ϕ は \pm の (一つの) 絶対既約成分である。

$a, b \in \mathbb{Q}_p^\times$ に対し, $\text{ord}_p(a) = \text{ord}_p(b)$ の時 $a \sim_p b$ とかく。

$$\# \Lambda_\phi / (\hat{f}(T; \omega\phi^{-1}), \omega_n) \sim \prod_p \prod_{\psi} \prod_{j^{p^n}=1} \hat{f}(j-1; \omega\phi^{-1})$$

であることに注意する。ここで, ψ は ϕ の \mathbb{Q}_p 上のすべての "共役" を動く。

(0.5) 注意. K の最大実部分体 K^+ と K の間で分解する p 上の primes が無い時は, 定理 (0.3) の formula は K の解析的類数公式からの直接の結果である (c.f. [1]). しかし K/K^+ で分解する p 上の primes が存在する時は, $(A'_{\infty})^{\Gamma_n}$ は無限群となり, ある ϕ に対して $f(0; \omega\phi') = 0$ となる.

(0.6) 注意. 定理 (0.3) を証明するには, Gauss 和と森田の p 進 Γ 関数の特殊値に関する Gross-Koblitz の formula 及び $L'_p(0; \chi)$ に関する Ferrero-Greenberg の formula を用いる.

(0.7) 注意. 仮定 (3) は本質的ではない. 実際, 定理 (2.1) を証明するためには, $[K: \mathbb{Q}]$ が p と素であると仮定する必要はない.

(0.8) 注意. Ferrero-Greenberg [2] は K が虚 2 次体で $n=0$ の時, 定理 (0.3) を証明している.

記号. 通常どおり $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ でそれぞれ, 有理整数環, 有理数体, 実数体, 複素数体を表す. 素数 p に対し, $\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p$ でそれぞれ p 進整数環, p 進数体を表す. \mathbb{Q} 及び \mathbb{Q}_p の代数閉包 $\overline{\mathbb{Q}}, \overline{\mathbb{Q}}_p$ を固定する. embeddings $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{C}$ 及び $p: \overline{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_p$ を固定する.

k/\mathbb{Q} を定理 (0.3) のようにとる. $[k:\mathbb{Q}]$ は p と素だから, k の p 上の primes はすべて k_∞ で完全分岐している. すべての $n \geq 0$ に対し $(A'_\infty)^{\Gamma_n}$ は有限であり, $A'_n \rightarrow A'_m$ ($m \geq n \geq 0$) は injective であるから, 次の補題を得る.

(1.1) 補題. 任意の $n \geq 0$ に対し, $m_0 \geq 0$ が存在し

$$(A'_\infty)^{\Gamma_n} = (A'_m)^{\Gamma_n} \quad \text{for } m \geq m_0 \quad \text{となる.}$$

\mathbb{Z} を k/\mathbb{Q} に關する p の分解群とする. $\phi \in \hat{G}$ に対し, $\text{Tr} \phi$ で ϕ を一つの絶対既約成分にもつ G の \mathbb{Q}_p -既約指標を表し, $e(\text{Tr} \phi)$ で $\text{Tr} \phi$ に対応する $\mathbb{Z}_p[G]$ の直交巾第元を表す. A_n, D_n, A'_n は自然に $\mathbb{Z}_p[G]$ -加群と見なせる. k の p 上の primes はすべて k_n で完全分岐しているから, 次の補題を得る.

(1.2) 補題. もし制限 $\phi|_{\mathbb{Z}}$ が trivial でなければ, すべての $n \geq 0$ に対して $e(\text{Tr} \phi) D_n = 0$ となる.

(1.3) 補題 (c.f. [3]). $m \geq n \geq 0$ に対して,

$$D_m^- / D_n^- \cong ((\mathbb{Z}_p / p^{m-n} \mathbb{Z}_p)[G/\mathbb{Z}])^- \quad (\mathbb{Z}_p[G]\text{-加群として}).$$

(1.4) 補題. $m \geq n \geq 0$ に対して,

$$0 \rightarrow D_n^- \rightarrow A_n^- \xrightarrow{\alpha} (A_m^-)^{\Gamma_n} / D_m^- \rightarrow 0$$

は $\mathbb{Z}_p[G]$ -加群の完全系列である. ここで α は $A_n^- \rightarrow A_m^-$ から誘導される.

$m \geq n \geq 0$ に対し

$$M_n^{(m)} = \{ \alpha \in A_m^- \mid (s-1)\alpha \in D_m^- \}$$

とおく. s は $\text{Gal}(\bar{k}_n/k_n)$ の生成元である (c.f. [3]). 準同型 $\beta: M_n^{(m)} \rightarrow D_m^-$ を $\beta(a) = (s-1)a$ で定義すると, $D_m^- \subset \text{Ker } \beta = (A_m^-)^{\Gamma_n}$ であり, $\mathbb{Z}_p[G]$ -加群の完全系列

$$0 \rightarrow (A_m^-)^{\Gamma_n}/D_m^- \rightarrow M_n^{(m)}/D_m^- \rightarrow D_m^- \quad (1.5)$$

を得る. $M_n^{(m)}/D_m^- = (A_m^-)^{\Gamma_n}$ だから, 補題 (1.4) より, $\mathbb{Z}_p[G]$ -加群の完全系列

$$0 \rightarrow A_n^- \rightarrow (A_m^-)^{\Gamma_n} \rightarrow D_m^- \quad (1.6)$$

を得る.

§2. Reduction

定理 (0.3) は次の定理 (2.1) に帰着される (証明略).

- (2.1) 定理. (1) k/\mathbb{Q} は有限次 abel 拡大であり,
 (2) k は虚であり,
 (3) P は k/\mathbb{Q} で完全分解して 11 と仮定すると,

$$\#(A_\infty^-)^{\Gamma_n} = \# \bigoplus_{\mathbb{Z}} \wedge_\phi / (\hat{f}(T; \omega \phi^{-1}), \omega_n) \quad \text{for } n \geq 0$$

が成立する. ここで \mathbb{Z} と ϕ は定理 (0.3) と同様に動く.

定理 (2.1) では $[k:\mathbb{Q}]$ が P と素であるという仮定は必要なく, P が k/\mathbb{Q} で完全分解して 11 ることが本質的である.

§3. 虚 P -単数群

以後は定理(2.1)の仮定(1)~(3)をみたしてゐるとする。 $n \geq 0$ に対し H_n を k_n の P -単数群とする。すなわち

$$H_n = \{ \alpha \in k_n^\times \mid (\alpha) = k_n \text{ の } P \text{ 上の primes の積} \}$$

$N_{m,n}: k_m \rightarrow k_n$ ($m \geq n \geq 0$) を norm 写像とする。

(3.1) 定義. 準同型 $\varphi_n^{(m)}: M_n^{(m)} \rightarrow H_n^{1-j}/N_{m,n}(H_m^{1-j})$ を次の様に定義する (c.f. [3]). s を $\text{Gal}(k_m/k_n)$ の生成元とする。 $c \in M_n^{(m)}$, $\alpha c \times$ すると, 或る $\alpha \in k_m^\times$ 及び u P 上の primes の積である k_m の ideal \mathfrak{o} が存在して, $\alpha c^{1-s} = (\alpha)\mathfrak{o}$ となる。

この時, $\varphi_n^{(m)}(c) = N_{m,n}(\alpha^{1-j}) \bmod N_{m,n}(H_m^{1-j})$ と定義する。

これは well-defined で (c.f. [3]), 次の補題を得る。

(3.2) 補題 ([3]). (1) $\text{Ker } \varphi_n^{(m)} = (A_m^-)^{\Gamma_n}$

(2) $\text{Im } \varphi_n^{(m)} = (H_n^{1-j} \cap N_{m,n}(k_m^\times)^{1-j}) / N_{m,n}(H_m^{1-j})$

(3.3) 系. $0 \rightarrow A_n^{1-j} \rightarrow (A_m^-)^{\Gamma_n} \rightarrow \text{Im } \varphi_n^{(m)} \rightarrow 0$

は $\mathbb{Z}_p[G]$ -加群の完全系列である。

§4. P 進 regulators

この節では H_0^{1-j} の或る部分群に対して P 進 regulator を定義する。後は定理(2.1)の仮定(1)~(3)をみたしてゐるとする。 E_n を k_n の単数群, $P_n = \{(\alpha) \mid \alpha \in H_n\}$ とする。完全系列 $0 \rightarrow E_n \rightarrow H_n \rightarrow P_n \rightarrow 0$ から完全系列 $0 \rightarrow$

$E_n \cap H_n^{-j} \rightarrow H_n^{-j} \rightarrow P_n^{-j} \rightarrow 0$ を得る. $\mu(k_n)$ で k_n に含まれる 1 の中根全体を表す. $E_n \cap H_n^{-j} = \mu(k_n) \cap H_n^{-j}$ だから ($n=0$ として)

$$\mu(k)H_0^{-j}/\mu(k) \simeq P_0^{-j} \quad (4.1)$$

を得る. P_0^{-j} は $\text{rank } g = [k:\mathbb{Q}]/2$ の自由 \mathbb{Z} -加群であることに注意する. M を $\mu(k)H_0^{-j}$ の部分加群で $\mu(k)M/\mu(k)$ の rank が g であるとしておく. m_1, \dots, m_g を $\mu(k)M$ の元で $m_1 \bmod \mu(k), \dots, m_g \bmod \mu(k)$ が $\mu(k)M/\mu(k)$ の \mathbb{Z} -基底であるものとする. s_1, \dots, s_g を $G/\{1, j\}$ の代表系とする. $\log p: \mathbb{Q}_p^\times \rightarrow \mathbb{Q}_p$ を $\log p p = 0$, $\log p j = 0$ ($j^{p-1} = 1$) で正規化された p 進 logarithm とする (c.f. [5]). 定理 (2.1) の仮定 (3) より $P(k) \subset \mathbb{Q}_p$ である. ただし $P: \overline{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_p$ は前に固定した embedding である.

(4.2) 定義. M の p 進 regulator $R_p(M)$ を

$$R_p(M) = \det \begin{pmatrix} \log p P(s_1 m_1), & \dots, & \log p P(s_1 m_g) \\ \vdots & & \vdots \\ \log p P(s_g m_1), & \dots, & \log p P(s_g m_g) \end{pmatrix} \text{ up to } \pm 1$$

で定義する. これは (s_1, \dots, s_g) 及び (m_1, \dots, m_g) の選び方によらない.

(4.3) 補題. $M_1 \subset M_2$ を $\mu(k)H_0^{-j}$ の部分加群で $R_p(M_1) \neq 0$ とする. この時, $R_p(M_2) \neq 0$ であり

$$R_p(M_1)/R_p(M_2) = (M_1(k)M_2 : M_1(k)M_1) \quad \text{up to } \pm 1.$$

§5. Gauss 和

この節では [4] で定義された Gauss 和を扱う。長は定理 (2.1) の仮定 (1) ~ (3) を満たしているとする。 N は k/\mathbb{Q} の conductor とする。 ϕ は k/\mathbb{Q} で完全分解しているので、 N は p と素である。 $K = \mathbb{Q}(\mu_N)$, $G_N = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$, $H = \text{Gal}(K/k)$, $D = K/\mathbb{Q}$ に関する ϕ の分解群とする。 μ_N は $\overline{\mathbb{Q}}$ に含まれる 1 の N 乗根全体である。 $(t, N) = 1$ である $t \in \mathbb{Z}$ に対して $s_t \in G_N$ を $s_t(\zeta) = \zeta^t$ ($\forall \zeta \in \mu_N$) で定義する。すると $D = \langle s_p \rangle$ である。 v を $p: \overline{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_p$ に対応する $\overline{\mathbb{Q}}$ の place とする。 \mathfrak{f} (resp. \mathfrak{f}_N) は v を k (resp. K) に制限して得られる k (resp. K) の prime とする。

(5.1) 定義. $\mathcal{A}_N = \frac{1}{N} \mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0 \bmod \mathbb{Z}\},$

$$\mathcal{A}_N = \text{Map}(\mathcal{A}_N, \mathbb{Z}) \quad \text{とおく.}$$

$a = (t/N \bmod \mathbb{Z}) \in \mathcal{A}_N$ に対し, $\delta_{t/N} = \delta_a \in \mathcal{A}_N$ を $\delta_a(a) = 1,$
 $\delta_a(b) = 0$ ($\forall b \in \mathcal{A}_N, b \neq a$) で定義する。 G_N の \mathcal{A}_N 上 \mathcal{A}_N の作用は次で与えられる。

$$s_t(t'/N \bmod \mathbb{Z}) = tt'/N \bmod \mathbb{Z} \quad \text{for } s_t \in G_N, t'/N \bmod \mathbb{Z} \in \mathcal{A}_N,$$

$$(s\alpha)(a) = \alpha(s^{-1}a) \quad \text{for } s \in G_N, \alpha \in \mathcal{A}_N, a \in \mathcal{A}.$$

Gauss 和 $g(\alpha, \mathfrak{f}_N, \mathbb{I} \circ \text{Tr}) = g(\alpha, \mathfrak{f}_N)$ を [4] の (1.3) 及び (1.4)

の様に定義する.

(5.2) Note. $\alpha \in N\mathcal{A}_N$ の時 $g(\alpha, \mathfrak{f}_N)$ は K^D に含まれ, G_N の作用は次のようになる.

$$g(\alpha, \mathfrak{f}_N)^s = g(s\alpha, \mathfrak{f}_N) \quad \text{for } s \in G_N.$$

$x \in \mathbb{R}$ に対し, $\langle x \rangle$ で $0 \leq \langle x \rangle < 1$, $x - \langle x \rangle \in \mathbb{Z}$ なる実数を表す. $a = (t/N \bmod \mathbb{Z}) \in \mathcal{A}_N$ に対し, $\langle a \rangle = \langle t/N \rangle$ とおき, $\alpha \in \mathcal{A}_N$ に対し, $n(\alpha) = \sum_{a \in \mathcal{A}_N} \alpha(a) \langle a \rangle$ とおく.

Γ_p を森田の p 進 Γ 関数とする. [4] と同様に $\Gamma_p: \mathcal{A}_N \rightarrow \mathbb{Z}_p$ を次のように定義する.

$$\Gamma_p(\alpha) = \prod_{a \in \mathcal{A}_N} \Gamma_p(\langle a \rangle)^{\alpha(a)} \quad \text{for } \alpha \in \mathcal{A}_N.$$

次の定理は Gross と Koblitz [4] によ, て証明された.

(5.3) 定理. $n(\alpha) \in \mathbb{Z}$ ならば

$$p(g(\alpha, \mathfrak{f}_N)) = (-p)^{n\left(\sum_{s \in D} s\alpha\right)} \Gamma_p\left(\sum_{s \in D} s\alpha\right) \quad \text{in } \mathbb{Q}_p.$$

(5.4) 系. $\alpha \in N\mathcal{A}_N$ ならば

$$\log_p p(g(\alpha, \mathfrak{f}_N)) = \sum_{s \in D} \log_p \Gamma_p(s\alpha).$$

$X^- = \{\phi \in \widehat{G} \mid \phi(j) = -1\}$ とする. $M \in \mathbb{N}$ の素数とす. $X_M = \{\phi \in X^- \mid \text{conductor of } \phi = M\}$, $H_M = \text{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_N)/\mathbb{Q}(\mu_M)) \subset G_N$ とおく. $2g = [k:\mathbb{Q}] = \#G = \#(G_N/H)$ であることを思い出す.

G_N/H の代表系 $\{s_1, \dots, s_{2g}\}$ ($s_i \in G_N, 1 \leq i \leq 2g$) を一つ固定する.

$\phi \in X^-$ に対し

$$e(\phi) = \frac{1}{\#G} \sum_{s \in G} \phi(s^{-1})s \in \overline{\mathbb{Q}_p}[G],$$

$$\tilde{e}(\phi) = \frac{1}{\#G} \sum_{i=1}^{2g} \phi((s_i H)^{-1})s_i \in \overline{\mathbb{Q}_p}[G_N]$$

とおく. $\#G \sum_{\phi \in X_M^-} e(\phi) \in \mathbb{Z}[G], \#G \sum_{\phi \in X_M^-} \tilde{e}(\phi) \in \mathbb{Z}[G_N]$ である.

(5.5) 定義. \mathcal{A}_R を $\{\#G \sum_{\phi \in X_M^-} e(\phi)N \delta_{1/M} \mid M|N\}$ で生成される $N\mathcal{A}_N$ の部分加群とする.

(5.6) 定義. $\alpha \in N\mathcal{A}_N$ に対応する \mathbb{R} の Gauss 和 $g_R(\alpha)$, 及び \mathbb{R} の Gauss 和の群 \mathcal{G}_R を

$$g_R(\alpha) = N_{K^D/\mathbb{R}}(g(\alpha, \mathfrak{f}_N)),$$

$$\mathcal{G}_R = \{g_R(\alpha) \mid \alpha \in \mathcal{A}_R\}$$

で定義する.

$\mathbb{Z}_p[G_N]$ 準同型 $S_R: N\mathcal{A}_N \rightarrow \mathbb{Z}[G]$ を

$$S_R(\alpha) = \sum_{s \in G_N} n(s\alpha)(sH)^{-1} \quad \text{for } \alpha \in N\mathcal{A}_N$$

で定義すると, \mathbb{R} における Stickelberger relation が得られる.

(5.7) $\alpha \in N\mathcal{A}_N$ ならば $(g_R(\alpha)) = \mathfrak{p}^{S_R(\alpha)}$ in \mathbb{R} .

\mathbb{D}_n ($n \geq 0$) を p 上の primes で生成される \mathbb{R}_n の ideal 群の部分群

とし, $\mathcal{G}_R = \{(g_R(\alpha)) \mid \alpha \in \mathcal{A}_R\}$ とおく. (5.7) より \mathcal{G}_R は

\mathbb{D}_0 の $\mathbb{Z}[G]$ -部分加群である.

(5.8) 命題. $(D_0^{-1,j}: G_k^{-1,j}) = (2gN)^g \prod_{M|N} (\#H_M)^{\#X_M^-} \prod_{\phi \in X^-} L(0; \phi^{-1})$.

g_k の p 進 regulator は p 進 L 関数を用いて計算される.

(5.9) 定理. $R_p(g_k) = (4gN)^g \prod_{M|N} (\#H_M)^{\#X_M^-} \prod_{\phi \in X^-} L'_p(0; \omega \phi^{-1})$ up to ± 1 .

Ferrero & Greenberg [2] は次の定理を証明した.

(5.10) 定理. $M|N$, $\phi \in X_M^-$ とする. この時,

$$L'_p(0; \omega \phi^{-1}) = \sum_{\bar{s}_t \in G_M} \phi^{-1}(\bar{s}_t) \log_p \Gamma_p(s_t \delta_{1/M}).$$

(5.10) と (5.4) より

$$L'_p(0; \omega \phi^{-1}) = \frac{1}{N \#H_M} \sum_{s \in G} \phi^{-1}(s) \log_p P(g_k(N \delta_{1/M})^s). \quad (5.11)$$

$g_{k,M} = g_k(N \delta_{1/M})$ とおく. $s_t \in G_N$ に対し, $s_t H = s$ とする.

$$\log_p P(g_k(N \#G \sum_{\psi \in X_M^-} \tilde{e}(\psi) s_t \delta_{1/M}))$$

$$= \log_p P \left(\begin{pmatrix} \#G \sum_{\psi \in X_M^-} e(\psi) s \\ (g_{k,M}) \end{pmatrix} \right).$$

(5.12) Claim. $L|N$, $\phi \in X_L^-$ とする.

$$\sum_{s \in G} \phi^{-1}(s) \log_p P \left(\begin{pmatrix} \#G \sum_{\psi \in X_M^-} e(\psi) s \\ (g_{k,M}) \end{pmatrix} \right)$$

$$= \begin{cases} \#G \sum_{s \in G} \phi^{-1}(s) \log_p P((g_{R,M})^s) & \text{if } L=M, \\ 0 & \text{if } L \neq M. \end{cases}$$

実際, $\log_p P(g_R^{1-j}) \in \mathbb{Q}_p$ であるから, $\overline{\mathbb{Q}_p}[G] \otimes \log_p P(g_R^{1-j}) = \overline{\mathbb{Q}_p}[G] = \sum_{\phi} e(\phi) \overline{\mathbb{Q}_p}$ の中で計算するこゝにより,

$$\begin{aligned} & e(\phi) \sum_{s \in G} s^{-1} \log_p P \left((g_{R,M})^{\sum_{\psi \in X_M^-} e(\psi) s} \right) \\ &= e(\phi) \#G \sum_{\psi \in X_M^-} e(\psi) \sum_{s \in G} s^{-1} \log_p P((g_{R,M})^s) \\ &= \begin{cases} e(\phi) \#G \sum_{s \in G} \phi^{-1}(s) \log_p P((g_{R,M})^s) & \text{if } L=M, \\ 0 & \text{if } L \neq M. \end{cases} \end{aligned}$$

定理(5.9)の証明

写像 $\text{Log}_p: H_0^{1-j} \rightarrow (1-j)\mathbb{Q}_p[G]$ を

$$\text{Log}_p(x) = (1-j) \sum_{s \in G/\{1,j\}} \log_p P(x^s) s^{-1} \quad \text{for } x \in H_0^{1-j}$$

で定義する. $\text{Log}_p(g_R^{1-j}) \in (1-j)\mathbb{Q}_p[G]$ であるから, $R_p(g_R^{1-j})$ を

$$(1-j)\mathbb{Q}_p[G] \otimes \overline{\mathbb{Q}_p} = (1-j)\overline{\mathbb{Q}_p}[G] = \bigoplus_{\phi \in X^-} e(\phi) \overline{\mathbb{Q}_p} \quad \text{の中で計算する.}$$

g_R^{1-j} は

$$(g_{R,M}^{1-j})^{\sum_{\psi \in X_L^-} e(\psi)} \quad \text{for all } M|N, L|N$$

で生成されるので (5.12) より

$$\begin{aligned} \pm R_p(\mathfrak{g}_k^{1-j}) &= \prod_{M|N} \prod_{\phi \in X_M^-} 2^{\#G} \sum_{s \in G} \phi^{-1}(s) \log_p P((\mathfrak{g}_{k,M})^s) \\ &= (2^{\#G})^{\#X^-} \prod_{M|N} \prod_{\phi \in X_M^-} N^{\#H_M} L'_p(0; \omega \phi^{-1}). \quad \text{Q.E.D.} \end{aligned}$$

Ferrero と Greenberg [2] は $L'_p(0; \omega \phi^{-1}) \neq 0$ であることを証明した。これより $R_p(\mathfrak{g}_k^{1-j}) \neq 0$ であり, 従って補題 (4.3) より

$$R_p(H_0^{1-j}) \neq 0 \quad (\text{c.f. [3]}) \quad (5.13)$$

§6. 定理 (2.1) の証明

この節では定理 (2.1) を証明する。 $n \geq 0$ とする。 \mathfrak{P}_n を k_n の単項 ideal 群とし, $P_n = \mathfrak{P}_n \cap \mathbb{D}_n$, $\mathcal{D}_n = \mathbb{D}_n / P_n$ とおく。すると

$$(\mathbb{D}_0^{1-j} : P_0^{1-j}) = \# \mathcal{D}_0^{1-j} \quad (2\text{-factor を除いて}) \sim_p \# \mathcal{D}_0^-$$

を得る。従って命題 (5.8) と定理 (5.9) より次を得る。

$$\pm \frac{R_p(\mathfrak{g}_k^{1-j})}{R_p(H_0^{1-j})} = (P_0^{1-j} : \mathfrak{G}_k^{1-j}) = \frac{(\mathbb{D}_0^{1-j} : \mathfrak{G}_k^{1-j})}{(\mathbb{D}_0^{1-j} : P_0^{1-j})} \quad (2\text{-factor を除いて}) \quad (6.1)$$

(6.2) 補題。 $m \geq 0$ の時,

$$\#(H_0^{1-j} / (H_0^{1-j} \cap N_{m,0}(k_m^x)^{1-j})) \sim_p P^{(m+1)g} / R_p(H_0^{1-j}).$$

(6.3) $n \geq 0$ 及び十分大きな $m \geq n$ に対して,

$$\mathbb{Z}_p \otimes (H_0^{1-j} \cap N_{m,0}(k_m^x)^{1-j}) = \mathbb{Z}_p \otimes (N_{n,0}(H_n^{1-j} \cap N_{m,n}(k_m^x)^{1-j})).$$

(6.4) $m \geq n \geq 0$ に対して,

$$\begin{aligned}
& (\mathbb{Z}_p \otimes H_0^{-j} : \mathbb{Z}_p \otimes (H_0^{-j} \cap N_{m,0}(\mathbb{Z}_m^\times)^{-j})) \\
&= (\mathbb{Z}_p \otimes P_0^{-j} : \mathbb{Z}_p \otimes (P_0^{-j} \cap N_{m,0}(\mathcal{O}_m^{-j}))), \\
& (\mathbb{Z}_p \otimes (H_n^{-j} \cap N_{m,n}(\mathbb{Z}_m^\times)^{-j}) : \mathbb{Z}_p \otimes N_{m,n}(H_m^{-j})) \\
&= (\mathbb{Z}_p \otimes (P_n^{-j} \cap N_{m,n}(\mathcal{O}_m^{-j})) : \mathbb{Z}_p \otimes N_{m,n}(P_m^{-j})).
\end{aligned}$$

$n \geq 0$ に対し, (6.3) をみたす $m \geq n$ をとる. norm 写像
 $N_{m,n} : D_m^{-j} \rightarrow D_n^{-j}$, $N_{n,0} : D_n^{-j} \rightarrow D_0^{-j}$ は bijective であるから, 次の図式が得られる.

$$\begin{array}{ccccc}
D_m^{-j} & & & & P_m^{-j} \\
\downarrow N_{m,n} & & & & \downarrow \\
D_n^{-j} & \supset & P_n^{-j} \cap N_{m,n}(\mathcal{O}_m^{-j}) & \supset & N_{m,n}(P_m^{-j}) \\
\downarrow N_{n,0} & & \downarrow & & \downarrow \\
D_0^{-j} & \supset & P_0^{-j} & \supset & P_0^{-j} \cap N_{m,0}(\mathcal{O}_m^{-j}) & \supset & N_{m,0}(P_m^{-j})
\end{array} \quad (6.5)$$

(6.5) より

$$\begin{aligned}
& (\mathbb{Z}_p \otimes (P_n^{-j} \cap N_{m,n}(\mathcal{O}_m^{-j})) : \mathbb{Z}_p \otimes N_{m,n}(P_m^{-j})) \\
&= \frac{(\mathbb{Z}_p \otimes D_m^{-j} : \mathbb{Z}_p \otimes P_m^{-j})}{(\mathbb{Z}_p \otimes D_0^{-j} : \mathbb{Z}_p \otimes P_0^{-j})(\mathbb{Z}_p \otimes P_0^{-j} : \mathbb{Z}_p \otimes (P_0^{-j} \cap N_{m,0}(\mathcal{O}_m^{-j})))}.
\end{aligned}$$

従, 補題(3.2) と (6.4) より,

$$\# I_m \varphi_n^{(m)} = \frac{\#(D_m^-/D_0^-)}{(\mathbb{Z}_p \otimes H_0^{-j} : \mathbb{Z}_p \otimes (H_0^{-j} \cap N_{m,0}(\mathbb{Z}_m^\times)^{-j}))}$$

となり, 更に補題(6.2) と 補題(1.3) を用いると

$$\# I_m \varphi_n^{(m)} \sim_p p^{-g} R_p(H_0^{-j}) \quad (6.6)$$

が得られる。

$$L'_p(0; \omega\phi^{-1}) \sim_p P \hat{f}(0; \omega\phi^{-1}) \quad (6.7)$$

であることに注意する。

定理(2.1)の証明

与えられた n に対し, $(A_{\infty}^{-})^{\Gamma_n} = (A_m^{-})^{\Gamma_n}$ となり, かつ (6.3) が成立する $m \geq n$ をとる. (3.3), (6.1), (6.6), (6.7) 及び

$$\#(A_n^{-}/A_0^{-}) \sim_p \prod_{\phi \in X^{-}} \prod_{\substack{\sum p^n = 1 \\ \sum \neq 1}} \hat{f}(\sum - 1; \omega\phi^{-1})$$

を用いて

$$\#(A_m^{-})^{\Gamma_n} \sim_p \prod_{\phi \in X^{-}} \prod_{\sum p^n = 1} \hat{f}(\sum - 1; \omega\phi^{-1})$$

を得る. Q.E.D.

§7. 例

1. $p=5$ とし, K を \mathbb{Q} 上の次数が 4 である $\mathbb{Q}(\exp(2\pi i/1949))$ の (唯一つの) 部分体とする. この時, 5 は K/\mathbb{Q} で完全分解し, $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ の虚 \mathbb{Q}_5 -既約指標は 2 つ存在する. $\#A_0^{-} = 5^3$, $D_0 \simeq \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ であることは容易にわかり, 従って $\#A_0^{-} = 5$ である. $\hat{f}(T; \omega\phi^{-1})$ の係数を近似計算することにより,

$$\# \bigoplus_{\mathbb{F}} \Lambda_{\phi} / (\hat{f}(T; \omega \phi^{-1}), \omega_0) = 5^3$$

が得られる。定理(0.3)を用いると $\#(A'_{\infty})^{\Gamma_0} = 5^3$ となる。
 従って $A'_0 \subseteq (A'_{\infty})^{\Gamma_0}$ である。更に $\#A'_1 = 5^9$, $\#D'_1 = 5^4$,
 $\#A'_1 = 5^5$ であることもわかる。 \mathbb{F} の λ_5 -invariant は 6 である。

2. $p=5$ とし, \mathbb{F} を \mathbb{Q} 上の次数が 4 である $\mathbb{Q}(\exp(2\pi i/2269))$
 の (唯一つの) 部分体とする。この場合は,

$$\bigoplus_{\mathbb{F}} \Lambda_{\phi} / (\hat{f}(T; \omega \phi^{-1}), \omega_0) = \{0\}$$

であり, 定理(0.3)を用いると, $(A'_{\infty})^{\Gamma_0} = \{0\}$ となる。従っ
 て $A'_0 = (A'_{\infty})^{\Gamma_0} = \{0\}$ であり, $\#D'_0 = \#A'_0 = 5^3$ となる。 \mathbb{F} の
 λ_5 -invariant は 2 である。

文献

1. J. Coates, S. Lichtenbaum: On l -adic zeta functions. Ann. Math. 98, 498-550 (1973)
2. B. Ferrero, R. Greenberg: On the behavior of p -adic L -functions at $s=0$. Inv. Math. 50, 91-102 (1978)
3. R. Greenberg: On a certain l -adic representation. Inv. Math. 21, 117-124 (1973)

4. B. Gross, N. Koblitz : Gauss sums and the p -adic Γ -function.
Ann. Math. 109, 569-581 (1979)
5. K. Iwasawa : Lectures on p -adic L -functions. Ann. Math. Studies
74, Princeton University Press, 1972
6. K. Iwasawa : On \mathbb{Z}_p -extensions of algebraic number fields.
Ann. Math. 98, 246-326 (1973)